

[, @] _7aN"3 ;], U53U 5f ,YF]8^5_ VU ,)I \$&/ \L%=\$L'
 0'<I\$1% G \$=Q \$0(I) S%Q=)' %m(L' \$TI)L 0\$1%Q%\$0 <(LP)L'
 [;]/ 5# ; _%Q=)' 6% 2*, ! , , (+) :>! */
 [, 9] E5NU ; ,Y8V 5Y ,E5NU f] ,)I \$&/ 3)&\$1%=< K)IR))=
 # \$LS)L< 1T L)=& T(=01%1= ,01L1=\$L' L%\$ T\$01L< \$=Q IH) 10?
 0(L)=0) \$=Q <)')L%' 1T 01L1=\$L' \$LI)L' Q%<)<) [;]/ 5IH?
)L1<0&)L1<% 2**@ , 9>(2) :@+! ?@+9/
 [2*] F7FN]7Y"3 YF ,F8;5[8 [,WF7V5Y] ,)I \$&/ "T%Q\$0'
 1T \$0%h\$K\$= RH)= 01#0\$)Q R%H R\$LT\$L%=- L)&\$1%1= 11 L)?
 =& T(=01%1= % 0\$1%)=I< R%H \$IL%\$& T%KL%&\$1%1=: %<%PHI<
 TL1# IH) 538YW7W]" IL%\$& [;]/ "(L F)\$LI ; ,2*, 2 ,! !
 (22) :2@2, 2@! */
 [2,] F8;5[8 [,7]6U3"N ; ,5N6"3YY7N \ ,)I \$&/ G' <I\$1% G
 % OL1P=1<1%0 T1L <IL1S) ,Q)\$IH \$=Q K&))Q%P Q(L%P \$=1%01?
 \$P(&\$1%1= 1T \$1L%\$& T%KL%&\$1%1= ?\$ L)&' <(K<1(Q' [;]/ G%L0(?

&\$1%1= 2*, , , 2C(2,) :5, 2C92/
 [22] 6" 7 3 _5W[3 _"YW"Nc5\ V c ,)I \$, / 8#0\$%)Q S%Q?
 =)' T(=01%1= \$=Q \$1L%\$& T%KL%&\$1%1= %)&Q)L&' <(Km)0I< [;]/
 ; G\$)Q J\$% 2*, * , . (,) :++? */
 [2!] N8] ,] \ ; ,F7 \]c ,)I \$, / G' <I\$1% G , \$<<10%\$1)Q R%H
 H)#? 1LLH\$P%0 \$=Q %0H)#%< <IL1S) %< \$ <IL1=P OL)Q%01L 1T
 IH) L%\$ 1T 0\$)Q%1' \$<0(&\$L ')'=I< \$=Q Q)\$IH % GH%<)<
 [;]/ YIL1S) , 2**> ! @ (, 2) :! 2@>? 2@@/
 [2C] 梁鹏 ,周芳/ 老年慢性房颤患者血清热休克蛋白 >* 和
 胱抑素 G 的表达及意义 [;]/ 河北医学 2*, + 2, (9) :
 , C++? , C+@/
 [2+] 8N_ " 3]5 ,W8UF87\ 53W F ,G73" YF ; ,)I \$&/ UJ3)<1%?
 # \$1%1= (<%P K) I\$IL\$0) OL1I) % \$=Q K) I\$2?#%0L1P&1K (&% %
 G_6 [;]/ 5# ; _%Q=)' 6% 2*, , , >(,) :C* ?@/
 (收稿日期: 2*, >?9? ,)

! 论著!

银杏叶提取物注射液对老年

基金项目: 安徽省自然科学基金课题(, C* @* @+ VF2* @)

作者简介: 张宣宣 硕士在读, " # \$% : C, , , @, 9, 9- bb/ 01#

通信作者: 王卫东 主任医师 教授 硕士生导师, " # \$% : ! +* ++, 9, +! - , . ! / 01#

统计学意义"

" 结果

2/1, 治疗前后炎性因子变化 疗
后观察组炎性因子水平较治: 疗
*A *+) ,对照组治疗前后差异均 两
组对应比较: 治疗前两组炎 组 #
WNJ] ? 水平比较 ,差异无: 后
观察组 WNJ] ? 明显低于: 后
5^N 明显高于对照组 (# j * / * +
2/2 两组患者继发脑梗死比较

病有一定作用" 李秀强^[1,2]对老年 2 型糖尿病患者随访, 年后,发现老年糖尿病患者脑卒中患病率, @/+B 本研究对照组与其结果一致" 国外一个多中心研究指出,年龄是糖尿病及并发症的独立危险因素^[1,2],且脑血管并发症发生率与糖尿病病程相关" 有研究证实,对糖尿病患者进行血脂#血压#血糖等多种危险因素联合药物进行综合干预,脑卒中发生率较单一常规治疗方法下降.@/>, B,本研究中,对老龄糖尿病患者多种危险因素进行控制,同时应用银杏叶提取物注射液治疗,使得脑梗死新发病例较对照组常规治疗明显减少 @>/ +B,达到干预的效果^[1,2]"

参考文献

- [1, 2] 中华医学会糖尿病学分会/中国 2 型糖尿病防治指南 (2*,! 版) [;]/中华糖尿病杂志 2*,C , (>) :CC> 29@/
[2] _"NN" 6a VE ,J5c38Y