[illegible]形成蛋白 -!/ 的初步研究 [illegible] # 生殖与避

[illegible] GH I?# 86I+*J6)OH5>)J A)FG6*)C)JIH)5+
[illegible]25*I JG??*)+ >5N*G 5FI6)I+ C5??)R

[illegible] J? - 0 E5>5?5@*)+ HKG
[illegible]5HG)+* [illegible] # e 45?

[illegible]兽综合

[illegible] 2011 China A[illegible] Electronic Publ[illegible]lec ro i [illegible] s l h ed / w . K i

照组与研究组，每组各 .$ 例。对照组患者在常规治疗基础上采用 6H - 9X 静脉溶栓治疗，研究组患者在对照组基础上加用银杏叶提取物注射液。两组均治疗 ! . A。疗程结束后，比较两组患者的日常生活能力(d;) 及神经功能缺损(S;E33) ，血清 f :X9、429 - !、脑源性神经营养因子(dYS:) 、神经生长因子(Sf :) 水平，临床疗效和不良反应发生率。结果 ! d; 及 S;E33: 疗程结束后，两组患者的 S;E33 及 d; 评分较治疗前改善，且研究组 S;E33(&# . , ^ "# %/) 分及 d;(,"# $$ ^ ,# 0%) 分优于对照组(! D"# "/) ; " f :X9 及 429 - !: 疗程结束后，两组患者的血清 f :X9 及 429 - ! 水平较治疗前降低，且研究组 f :X9("# $. ^ "# "&) #@ '7 及 429 - !(, /# &! ^ %# &0) #@ '7 低于对照组(! D"# "/) ; %dYS: 及 Sf :: 疗程结束后，两组患者的 dYS: 及 Sf : 水平较治疗前增高，且研究组 dYS:(/# /B ^ "# /.) +@ '>? 及 Sf :(!. /# . ! ^ . # !!) +@ '>? 高于对照组(! D"# "/) ; & 临床疗效: 研究组总有效率(%"# , " =) 高于对照组(, . # . 0 =) (! D"# "/) ; ' 不良反应: 研究组不良反应发生率(!$# %/ =) 与对照组(%# $" =) 比较，差异无统计学意义(! a"# "/) 。结论 急性脑梗死患者采取 6H - 9X 静脉溶栓 j 银杏叶提取物注射液治疗，有利于神经功能及日常生活能力改善，调节患者血清 429 - !、f :X9、dYR S:、Sf : 水平，提高疾病整体治疗效果，且安全性具有保障。

【关键词】 急性脑梗死 银杏叶提取物注射液 阿替普酶 静脉溶栓 神经功能 单核细胞趋化蛋白 - ! 神经胶质纤维酸性蛋白 脑源性神经营养因子 神经生长因子

$%%&' ( )% -77,2' -(2)0 82(* L2005) J2,)<- &.(/-'(')1<20&6 ;,(&7,-4& %)/ 20(/->&0)34 (*/)1<),+424)0 0&3/),)52' -, %30'(2)0 -06 4&/31 ,&>&,4)% ? AC - ! -06 LF ; C 20 7-(2&0(4 82(* -'3(& '&/&</-, 20%-/'(2)0: %-H ")3*+ - 7&'*! , ,$- ,& - *'*0 , ?0 F)'* - <'*+0 8 ! 93:';6 . 3*6 (< 135;(7(+J, 0 93:';6 . 3*6 (< H . 3;+3*AJ, R3&&*+ 9&6'* #(D:&6'7, "':&6'7 ?3@&A'7 - *&N3;D&6J, R3&&*+ !"""!/, ")&*'8

【 ; <4(/-'(】 "<=&'(2>&

C 199 201 China A ad c Jo r al lec ro i P li s l h ed / w . k .

观

表 . 两组患者的血清 f:X9 及 429 - ! 水平比较 (#@'7,Ḡ ^ D)

组别	例数	f:X9 水平		6 值	! 值	429 - ! 水平		6 值	! 值
		治疗前	疗程结束后			治疗前	疗程结束后		
研究组	.$	!#/%^"#$/	"#$.^"#"&	0$#"B$	"#"""	!!%#.!^!0#/&	,/#&!^%#&0	!B#!/.	"#"""
对照组	.$	!#&!^"#$,	"#B!^"#"/	!.#"/!	"#"""	!0!#$&^!0#/.	B%#,B^%#&,	!$#",,	"#"""
6 值		"#0/B	$%#.&!			"#,0!	&#B!0		
! 值		"#,%,	"#"""			"#.,$	"#"""		

0#. 两组患者的血清 dYS: 及 Sf: 水平比较 治疗前,两组患者的 dYS: 及 Sf: 水平比较,差异无统计学意义(! a"#"/);疗程结束后,两组患者的 dYS: 及 Sf: 水平高于治疗前,且研究组明显高于对照组,差异有统计学意义(! D"#"/)。见表 /。

表 / 两组患者的血清 dYS: 及 Sf: 水平比较 (+@'>?,Ḡ ^ D)

组别	例数	dYS: 水平		6 值	! 值	Sf: 水平		6 值	! 值
		治疗前	疗程结束后			治疗前	疗程结束后		
研究组	.$	.#"$^"#,!	/#/B^"#/.	!!#$%.	"#"""	!00#0,^&#.%	!./#.!^.#!!	!%#,/$	"#"""
对照组	.$	$#%&^"#&&	.#&$^"#&"	.#%0&	"#"""	!0.#"/^/#B!	!$B#&/^$#&$	!$#%,/	"#"""
6 值		"#.,.	,#,!,			!#$."	B#"B.		
! 值		"#&$,	"#"""			"#!B.	"#"""		

0#/ 两组患者的不良反应发生率比较 研究组患者的不良反应发生率(!$#%/=)与对照组(%#$"=)比较,

C 199 201 China A ad c Jo r al lec ro i P li s l h ed / w . k .

态，以此提高疾病治疗效果。另外，本研究结果显示，两组患者不良反应发生率差异无统计学意义(! a"#"/)，表明上述联合治疗方案具有安全性。

. 结论

急性脑梗死患者采取 6H - 9X 静脉溶栓 j 银杏叶提取物注射液治疗，有利于神经功能及日常生活能力改善，调节患者血清 429 - !、f :X9、dYS:、Sf: 水平，提高疾病整体治疗效果，且安全性具有保障。但本研究样本量选取较少，且观察研究时间较短，故研究结果是否具备广泛效力仍需进一步研究证实。

参考文献

[!] dGJT 2，[6NGHQG?>I++ X，:56TG6H SY，GH I?# X *)>O?G U6I)+ IH65OKL >GI*N6G)>O65FG* HKG O6GA)JH)5+ 5C >I?)@+I+H >)AA?G JG6GU6I? I6HG6L)+R CI6JH)5+ UL IJNHG Y ‘ ; ?G*)5+ F5?N>G [a] # e SGN65?,O"!.,O&!(&):!"%, -!!"$#

[2] 李春雷，张峰# 醒脑静注射液联合银杏H 静注呻l 麼瓤 0 张 鸨 饲